

KERTÉSZETI KULTÚRÁK

Tápanyag-utánpótlása



KITE

Tartalomjegyzék

BIOSTIMULÁTOROK

DELL" AGRO PLUS.....	3
RHYZO PLUS	4
FRUCTON FL.....	5
BATALLON	6

LOMBTRÁGYÁK

CAOS XT.....	7
K-FORTE.....	8
MOLIBORO, CUPRA GL.....	9
TUNDAMIX, ZINCO.....	10

TÁPANYAGELLÁTÁSI PROGRAM

CSEMEGEKUKORICA	11
ZÖLDBORSÓ, KÁPOSZTA.....	12
PARADICSOM, BURGONYA.....	13
UBORKA, HAGYMA	14
BROKKOLI, PAPRIKA	15
SALÁTA, SZŐLŐ	16
CSERESZNYE/MEGGY, ALMA ÉS KÖRTE.....	17
ŐSZIBARACK, KAJSZI ÉS SZILVA	18
SZAMÓCA.....	19

DELL"AGRO PLUS

Összetevőinek köszönhetően gyökéren és lombon keresztül is hatékony. Energiát biztosít, segítségével nő a vitalitás, valamint gyors stresszreakció érhető el a használatával, biztosítva a növény optimális fejlődését.

ThinkGreen



Kiszerelés:
1 l, 5 l, 20 l, 1000 l

Lombon keresztül

Tápoldatozás

Gyors válaszreakció stresszes körülmények között, stimulálja a vegetatív növekedést és a kiegyensúlyozott növényi termőképességet.

Széles spektrumban tartalmaz biostimuláns molekulákat: aminosavakat, peptideket, természetes fitohormonokat és másodlagos anyagcseretermékeket.

Komplexbéplő-hatás a talajban lévő blokkolt elemekre pl.: alacsony hőmérséklet vagy szélsőséges pH estén.

Hatással van a talaj fizikai, kémiai és mikrobiológiai tulajdonságainak a regenerációjára.

A TERMÉK ÖSSZETÉTELE:

Szervesanyag-tartalom: 60 m/m %

Aminosav-tartalom:

21.67 m/m%; L-Aszparagin 1.18%;
L-Glutamin 16.15%; L-Arginin <0.10%;
L-Alanin 2.64%; L-Leucin 0.13%; L-Glicin
0.28%; L-Hisztidin; 0.13%; L-Prolin 1.04%;
L-Metionin <0.10%; L-Izoleucin <0.10%;
L-Fenilalanin <0.10%; L-Lizin <0.10%;
L-Cisztin <0.10%

Mono-, di- és poliszacharid-tartalom: 6,2 w/w %

Fruktóz 0.25%; Glükóz 0.70%; Raffinóz
0.50%; Szacharóz 0.25%; Trehalóz 3.50%;
Cellulóz 1.00 %

Fulvosavtartalom: 23.1 % w/w

Nitrogéntartalom: 8.0 % w/w

Foszfortartalom: 0.5 % w/w

Káliumtartalom: 0.2 % w/w

DÓZIS ÉS KIJUTTATÁS



Lombkezelés: 2-4 l/ha | Tápoldatozás: 5-10 l/ha

Javasolt felhasználás

KULTÚRÁK ÁLTALÁBAN
SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁK



Vetés
Ültetés
Gyökérfejlődés
Csírázás



Vegetatív növekedés
Rügyezés
Bokrosodás
Szárképződés



Virágzás
Terméskötődés
Virágzat kialakulása



Termésnövekedés
Érés
Terméstelítődés
Érés



Betakarítás

KIEMELT KÍSÉRLETI EREDMÉNY

Saláta fajta: Trocadero
Granada, Spanyolország

MAGASABB TERMÉSÁTLAG: +22% (6.016 kg/ha)

KORAISÁG: -11,9% (5 nappal korábbi)

RHYZO PLUS

Gyökerezéscsökkentő készítmény.

Think Green



Kiszárazás:
1 kg

Tápellátás

Aktiválja a gyökérbőzödést a kritikus időszakokban a növény fejlődése folyamán.

Homogén és optimális fejlődést biztosít a növény számára a kezdeti időszak-tól fogva.

Csökkenti az ültetés, a téli nyugalmi periódus és az esetleges vízzel borított időszakok után fellépő stresszt a biostimuláns komponenseknek köszönhetően.

A RHYZO PLUS ÖSSZETEVŐI:

- Auxin és polyamine prekursor szabad-aminosavak.
- A gyökérbőzödést fokozó bioinduktorok.
- Foszfor, ami stimulálja a gyökér növekedését és megalapozza a növény korai fejlődését.
- Nitrogén, ami a növény vegetatív növekedését segíti.

A TERMÉK ÖSSZETÉTELE:

Szabad aminosavak: 58.0 % w/w

Összes nitrogén (N): 10.8 % w/w

Szerves nitrogén (N): 9.8 % w/w

Ammonium nitrogén (N): 1.0 % w/w

Foszfor-pentoxid (P_2O_5) vízzoldható: 5.0 % w/w

Technológia

A Rhyzo Plus-ban jelenlévő szabad aminosavak a *BNS Platform Technológia* által felöltött bakteriális fermentációból származnak, ami lehetővé teszi az adaptációt különböző talaj, növény és klíma esetén.



DÓZIS ÉS KIJUTTATÁS



Tápellátás: 1-3 kg/ha

Javasolt felhasználás

KULTÚRÁK ÁLTALÁBAN
SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁK



Vetés
Ültetés
Gyökérbőzödés
Csírázás



Vegetatív növekedés
Rügyezés
Bokrosodás
Szárképződés



Virágzás
Terméskötődés
Virágzat kialakulása



Termésnövekedés
Érés
Termésteremtődés
Érés



Betakarítás

KIEMELT KÍSÉRLETI EREDMÉNY

Paradicsom

Fajta: Byelsa, Almeria, Spanyolország

LÁTHATÓ GYÖKÉRFELÜLET, +38.54% (+30.11 cm²)

FRUCTON FL



Kiszerezés:
1 l, 5 l

Lombon keresztül

Tápoldatozás

- Jobb minőség és homogén termésméret a betakarításkor.
- Megelőzi a mikrorepedéseket köszönhetően a sejtfalak flexibilitásának.
- Erősíti a tartaléktápanyagok szintézisét (cukrok, olajok) a gyümölcs növekedése folyamán.

A TERMÉK ÖSSZETÉTELE:

Nitrogén (N): 3.4 % w/w

Szabad aminosavak: 2.0 % w/w

Biostimulánsok: 14.0 % w/w

Összes szerves anyag: 25.0% w/w

A FRUCTON FL ÖSSZETEVŐI:

- Az **aminosavak** elősegítik a tartalék tápanyagok – cukrok, olajok szintézisét a gyümölcsnövekedés során. Növeli a vízhiánnyal szembeni ellenállóképességet, javítja a gyümölcs minőségét, méretét és a termőképességet.
- A **bioaktivátorok** hatására egyöntetűbb virágzás, kötődés és homogén termésképződés alakul ki, csökken a virág- és terméselrűgás.
- Az **ozmoreguláció** lehetővé teszi a gyümölcs sejtfalának megnyúlását, megakadályozva a mikro- és makrorepedéseket, köszönhetően az expanszinek közvetlen stimulációjának. Ezek megkönnyítik a gyümölcs bőrrétegei közötti kölcsönhatást, elősegítve a gyümölcs növekedését anélkül, hogy a sejtfal megsérülne.

DÓZIS ÉS KIJUTTATÁS



Lombkezelés: 2-4 l/ha
Tápoldatozás: 5-8 l/ha

Javasolt felhasználás

KULTÚRÁK ÁLTALÁBAN
SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁK



Vetés
Ültetés
Gyökérfejlődés
Csírázás



Vegetatív növekedés
Rügyezés
Bokrosodás
Szárképződés



Virágzás
Terméskötődés
Virágzat kialakulása



Termésnövekedés
Érés
Terméstelítődés
Érés



Betakarítás



BATALLON

Biostimulátor, amely növeli a termésátlagot és a gyümölcsméretet, valamint nagyobb korai terméshányadot érünk el használatával.

ThinkGreen



Kiszerelés:
5 l, 20 l

Tápoldatozás

- Nagyobb termésátlag.
- Használata előnyös a koraiság és a gyümölcsméret szempontjából.
- A termést növeli a hűvös időszakban vagy kedvezőtlen pH esetén is.

HATÓANYAGTARTALOM:

K₂O - tartalom: 5.5 % w/w

N-tartalom: 0.5 % w/w

Fulvósavak: 37.6 % w/w

TECHNOLÓGIA

- Gyökérstimuláció: Auxinszerű hatás.
- Jobb tápanyagfelvétel: Komplexképző hatás.
- Stabilizálja a talaj kondícióját: Hűvös vagy kedvezőtlen pH esetén is.

FELHASZNÁLHATÓ:

- Szántóföldi és kertészeti kultúrák talajkezelésére a tenyészidőszak során 3-4 alkalommal 10-20 l/ha mennyiségben, legalább 5 l/m² vízmennyiséggel a talajfelszínre kiöntözve, illetve csepegtető öntözéssel a talajba kijuttatva.

DÓZIS ÉS KIJUTTATÁS



Tápoldatozás: 10-20 L/ha

Javasolt felhasználás

KULTÚRÁK ÁLTALÁBAN
SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁK



Vetés
Ültetés
Gyökérfejlődés
Csírázás



Vegetatív növekedés
Rügyezés
Bokrosodás
Szárképződés



Virágzás
Terméskötődés
Virágzat kialakulása



Termésnövekedés
Érés
Terméstartósítás
Érés



Betakarítás

KIEMELT KÍSÉRLETI EREDMÉNY

Pepper, var. Melchor
Ciudad Real, Spanyolország



ÖSSZES TERMÉS: KG/HA

Termés többlet: 4.958 kg/ha
6.6% növekedés

Első osztályú terméshányad
kg/ha

10.417 kg/ha többlet
16,5% növekedés

ÖSSZEGZÉS

- Nagyobb termésátlag
- Jobb minőség
 - Több első osztályú termés
 - Termésméret növekedés

CAOS XT

Think Green



Kiszerelés:
1 l, 5 l, 20 l

Lombon keresztül

Tápoldatozás

- A termésnek kiváló konzisztenciát és húskeménységet biztosít.
- Megelőzhetők, illetve javíthatók a kalciumhiány okozta tünetek, illetve elváltozások.
- Növeli a pulton tarthatóságot.

A TERMÉK ÖSSZETÉTELE:

Kalcium (CaO): 15.0 % w/w

Bór (B) 0.7 % w/w

Összes Nitrogén (N): 0.4 % w/w

Kelátképző: Lignoszulfonsav

Technológia

Az *XT Technológia* molekulák kombinációján alapszik, amellyel biztosítjuk a lombon keresztül történő felvételt és az elemek növényen belüli mobilitását.

DÓZIS ÉS KIJUTTATÁS



Lombkezelés: 1-3 l/ha
Tápoldatozás: 3-6 l/ha

Javasolt felhasználás

KULTÚRÁK ÁLTALÁBAN
SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁK



Vetés
Ültetés
Gyökérfejlődés
Csírázás



Vegetatív növekedés
Rügyezés
Bokrosodás
Szárképződés



Virágzás
Terméskötődés
Virágzat kialakulása



Termésnövekedés
Érés
Terméstelítődés
Érés



Betakarítás



K-FORTE



Kiszerezés:
5 l, 20 l

Lombon keresztül

Tápoldatozás

- Segíti a termés növekedését és a telítődést.
- Javítja a minőséget, színeződést és a homogenitást az érés időszakában.
- Hasznára van a növényi fejlődésnek, légzésnek és fotoszintézisnek.
- Gyors káliumasszimiláció, köszönhetően a termék semleges kémhatásának.

A TERMÉK ÖSSZETÉTELE:

Összes nitrogén (CaO): 3.0 % w/w

Kálium (K₂O) 26.0 % w/w

Kelátképző: EDTA

Javasolt felhasználás

KULTÚRÁK ÁLTALÁBAN
SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁK



Vetés
Ültetés
Gyökérfejlődés
Csírázás



Vegetatív növekedés
Rügyezés
Bokrosodás
Szárképződés



Virágzás
Terméskötődés
Virágzat kialakulása



Termésnövekedés
Érés
Terméstelítődés
Érés



Betakarítás

DÓZIS ÉS KIJUTTATÁS



Lombkezelés: 2-4 l/ha
Tápoldatozás: 4-6 l/ha

KIEMELT KÍSÉRLETI EREDMÉNY

Paprika fajta: Melchor
Almeria, Spanyolország

MAGASABB HOZAM + 4.08% (+957 kg/ha)

TERMÉSNÖVEKMÉNY paprikában
(3 szedés, kg/ha) + 19.64% (+2,879 kg/ha)



MOLIBORO

Kiszerelés:
1 kg

Lombon keresztül

Tápoldatozás

- Növeli a virágzás egyöntetűségét és a pollen mennyiségét.
- Javítja a kötődést és a termés alakváltozását, csökkenti a deformáció lehetőségét.
- Az összetevők kombinációjának köszönhetően minimalizálja a virág-, illetve terméselrűgést.

DÓZIS ÉS KIJUTTATÁS



Lombkezelés: 1-2 kg/ha
Tápoldatozás: 1.5-3 kg/ha

A TERMÉK ÖSSZETÉTELE:

Foszfor (P_2O_5): 16.8 % w/w

Kálium (K_2O): 11.0 % w/w

Bór (B): 8.35 % w/w

Molibdén (Mo): 11.0 % w/w

Javasolt felhasználás

KULTÚRÁK ÁLTALÁBAN
SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁK



Vetés
Ültetés
Gyökérfejlődés
Csírázás



Vegetatív növekedés
Rügyezés
Bokrosodás
Szárképződés



Virágzás
Terméskötődés
Virágzat
kialakulása



Termésnövekedés
Érés
Terméktelítődés
Érés



Betakarítás

CUPRA GL

Összetett formulációjú szintelen, folyékony rézhiány-korrektor.

Kiszerelés:
5 l, 20 l

Lombon keresztül

Tápoldatozás

- Nem színezi be sem a levelet, sem a termést, köszönhetően a szintelen, folyékony formulációnak.
- Emeli a lignin szintézist, megerősíti a növényi szövetek sejtfalát, erősíti a növény önvédelmi rendszerét.
- A szerves savakkal alkotott komplex formuláció megakadályozza a talajban történő lekötődést, illetve növeli a lombon és gyökéren keresztül történő felvételt.

- A kiemelkedő mobilitásnak köszönhetően gyors és hatékony megelőzés vagy korrekció érhető el a használatával.

A TERMÉK ÖSSZETÉTELE:

Réztartalom: 5.51 % w/w

SO_3 -tartalom: 6.83 % w/w

Komplekképzők:
(galakturonsav és glükonsav): 5.32 % w/w

DÓZIS ÉS KIJUTTATÁS



Lombkezelés: 2-3 l/ha
Tápoldatozás: 2-4 l/ha

Technológia

A Cupra GL előállítását a *GL Technológián* alapszik: komplex formulációt képzünk a rézzel, segítve ezzel a felvehetőséget és a növényben történő mobilitást, köszönhetően a sejtfalakban történő glükonit-galakturonit hatásnak, továbbá emeli a fitoalexinek szintézisét.



Javasolt felhasználás

KULTÚRÁK ÁLTALÁBAN
SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁK



Vetés
Ültetés
Gyökérfejlődés
Csírázás



Vegetatív növekedés
Rügyezés
Bokrosodás
Szárképződés



Virágzás
Terméskötődés
Virágzat
kialakulása



Termésnövekedés
Érés
Terméktelítődés
Érés



Betakarítás

TUNDAMIX

Kiváló oldhatóságú kelatizált mikroelemek keveréke.

ThinkGreen

Kiszerelés:
1 kg

Lombon keresztül

Tápoldatozás

- 100%-ban vízoldható mikrogranulátum, minden szemcse garantáltan ugyanolyan összetételű, így minden mikroelem könnyen elérhető.
- Megelőzi vagy szükség esetén javítja a mikroelemhiány okozta tüneteket és következményeit.
- Gyors asszimiláció, köszönhetően a kelatizált formulációnak.
- Növeli a fotoszintézis hatékonyságát az összetevők szinergájának köszönhetően.

DÓZIS ÉS KIJUTTATÁS



Lombkezelés: 2-5 kg/ha
Tápoldatozás: 2-5 kg/ha

A TERMÉK ÖSSZETÉTELE:

Vas (Fe): 7.7 % w/w

Mangán (Mn): 3.7 % w/w

Cink (Zn): 0.8 % w/w

Réz (Cu): 0.4 % w/w

Bór (B): 0.7 % w/w

Molibdén (Mo): 0.5 % w/w

Kelátképző: EDTA

Javasolt felhasználás

KULTÚRÁK ÁLTALÁBAN
SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁK



Vetés
Ültetés
Gyökérfejlődés
Csírázás



Vegetatív növekedés
Rügyezés
Bokrosodás
Szárképződés



Virágzás
Terméskötődés
Virágzat
kialakulása



Termésnövekedés
Érés
Terméstelítődés
Érés



Betakarítás

ZINCO

Kelatizált cink, a cinkhiány megelőzésére.

Kiszerelés:
5 l, 20 l

Lombon keresztül

Tápoldatozás

- Azonnali hatás hiánytünetek esetén.

- A komplex formulációnak köszönhetően teljes felvehetőség biztosított kedvezőtlen talaj vagy víz pH esetén is.

A TERMÉK ÖSSZETÉTELE:

Cink (Zn): 10.2 % w/w, vízoldható

DÓZIS ÉS KIJUTTATÁS



Lombkezelés: 1-1,5 l/ha
Tápoldatozás: 3-4 l/ha

A cinkhiány tünetjei lehetnek:

- Gyenge növekedés.
- Halványzöld részek a fiatal leveleken a levélerek között.
- Csökkent levélméret.

Javasolt felhasználás

KULTÚRÁK ÁLTALÁBAN
SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁK



Vetés
Ültetés
Gyökérfejlődés
Csírázás



Vegetatív növekedés
Rügyezés
Bokrosodás
Szárképződés



Virágzás
Terméskötődés
Virágzat
kialakulása



Termésnövekedés
Érés
Terméstelítődés
Érés



Betakarítás

TÁPANYAGELLÁTÁSI PROGRAM



CSEMEGEKUKORICA

LOMBKEZELÉS

TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁSOK

DELL`AGRO PLUS:


3 leveles állapottól lombtrágyaként 2-4 l/ha dózisban címerhányásig (csak a vegetatív részekre fókuszálva).

ZINCO:

4-7 leveles állapottól virágzásig 1-1,5 l/ha dózisban vagy Dell`Agro Plus-al kombinálva: normál állomány esetén Dell`Agro Plus 2 l/ha + Zinco 1 l/ha, gyengébb állományban Dell`Agro Plus 3 l/ha + Zinco 1,5 l/ha.

TUNDAMIX: 1-3 kg/ha

Mikroelemek keveréke teljesen oldható formában, megelőzi és korrigálja ezek esetleges hiányát. Prevencióként kisebb dózisokban az egész cikluson keresztül javasolt alkalmazni. Növeljük a dózist és a használat gyakoriságát súlyos hiánytünetek vagy a növény számára kedvezőtlen feltételek esetén.





ZÖLDBORSÓ

LOMBKEZELÉS

TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁSOK

DELL"AGRO PLUS: 2-4 l/ha

Javasolt alkalmazás: egy kezeléssel 5-6 nóduszos állapotban 4 l/ha, illetve osztott kezeléssel 2x2 l/ha, a második kezelést végezzük 10-12 nappal az első kijuttatás után. A kezeléseket ne végezzük gombás fertőzés esetén. Nem keverhető kénnel és rézzel. Nem keverhető magas alkalikus reakciójú termékekkel (ásványi olajok). Ne használjuk hidrogén-peroxid vagy klór alapú termékekkel, mert ezek csökkentik a hatékonyságot.

MOLIBORO: 1-2 kg/ha

Használatával egyöntetű virágzás érhető el, növekszik a pollen mennyisége, ez különösen nagy előnyt nyújt kedvezőtlen körülmények esetén. Ne lépjük túl a javasolt dózist. Ne keverjük olajokkal, savas termékekkel, kénnel, rézzel és alkalikus reakciójú termékekkel. Ne használjuk együtt réztartalmú gombaölő szerekkel. Más termékkel történő együtthasználat előtt mindig végezzünk keverési próbát.

CAOS XT: 2-4 l/ha

Alkalmazása: a virágzás kezdetétől javasolt 2 l/ha, lombkezeléssel kijuttatva. Szükség esetén a kezelés ismételt 7-10 naponta. Használatával megelőzzük a hiánytüneteket és növeljük a termés szárazanyag-tartalmát, ezzel növeljük a frissen tarthatóságát. A termékben található bórnak köszönhetően a kalcium könnyen eljut a különböző növényi részekbe. Súlyos hiánytünet esetén a maximális dózissal dolgozzunk.



KÁPOSZTA

TÁPOLDATOZÁS LOMBKEZELÉS


TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁSOK

+ RHYZO PLUS + DELL"AGRO PLUS:
1kg/ha + 5 l/ha

Javasolt kezelések: először palántázás után azonnal, majd 7-10 nappal később megismételni. A legjobb eredmény eléréséhez nagy vízáddal dolgozzunk, és lehetőleg emeljük meg a tápoldat pH-ját a jobb oldhatóság eléréséhez. Szintén javasolt az alkalmazás minden olyan esetben a fenológiai ciklusok folyamán, amikor a gyökér sérül, pl.: gyökérfulladás vagy agresszív, vegyszer okozta probléma esetén.

DELL"AGRO PLUS: Lombkezelés: 2-4 l/ha
Tápoldatozás: 5-10 l/ha

Használjuk a teljes termelési cikluson keresztül, a növényt folyamatosan aktív állapotban tartva. Javasolt magasabb dózisú kezelés – 20 l/ha – olyan esetekben, amikor a növény erős stresszhelyzetbe kerül. A kezeléseket bármelyik növényi ciklusban elvégezhetők, kivéve gombás fertőzés esetén. Nem keverhető kénnel és rézzel. Nem keverhető magas alkalikus reakciójú termékekkel (ásványi olajok). Ne használjuk hidrogén-peroxid vagy klór alapú termékekkel, mert ezek csökkentik a hatékonyságot.




	Csírázás	Vegetatív Növekedés	Virágzás	Terméskötődés	Termésnövkedés
DELL"AGRO PLUS					
MOLIBORO					
CAOS XT					
CUPRA GL					
TUNDAMIX					

TUNDAMIX: 2-5 kg/ha

Mikroelemek keveréke teljesen oldható formában megelőzi és korrigálja ezek esetleges hiányát. Prevencióként kisebb dózisokban az egész cikluson keresztül javasolt alkalmazni. Növeljük a dózist és a használat gyakoriságát súlyos hiánytünetek vagy a növény számára kedvezőtlen feltételek esetén.

CUPRA GL: 2-3 l/ha

Kezelések a tenyészidőszakban bármikor végezhetők 10-15 napos fordulókkal a gombabetegségek megelőzésére.



	Ültetés	Vegetatív növekedés	Érés	Betakarítás
RHYZO PLUS				
DELL"AGRO PLUS				
CAOS XT				
TUNDAMIX				

CAOS XT: Lombkezelés: 1-3 l/ha
Tápoldatozás: 3-6 l/ha

Legalább négy kezelés javasolt.

TUNDAMIX:

Hiánytünetek esetén: 2-5 kg/ha
Hiánytünetek megelőzésére: 1-2 kg/ha



PARADICSOM

TÁPOLDATOZÁS
LOMBKEZELÉS

TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁSOK

■ + ■ RHYZO PLUS + DELL"AGRO PLUS:
1 kg/ha + 5 l/ha

Javasolt kezelések: először palántázás után azonnal, majd 7-10 nappal később megismételni. A legjobb eredmény eléréséhez nagy vízáddal dolgozzunk és lehetőleg emeljük meg a tápoldat pH-ját a jobb oldhatóság eléréséhez. Szintén javasolt az alkalmazás minden olyan esetben a fenológiai ciklusok folyamán, amikor a gyökér sérül, pl. gyökérfulladás vagy agresszív, vegyszer okozta probléma esetén.

■ DELL"AGRO PLUS: Lombkezelés: 2-4 l/ha
Tápoldatozás: 5-10 l/ha

Használjuk a teljes termelési cikluson keresztül, a növényt folyamatosan aktív állapotban tartva. Javasolt magasabb dózisú kezelés – 20 l/ha – olyan esetekben, amikor a növény erős stresszhelyzetbe kerül. A kezelések bármelyik növényi ciklusban elvégezhetők, kivéve gombás fertőzés esetén. Nem keverhető kénnel és rézzel. Nem keverhető magas alkalikus reakciójú termékekkel (ásványi olajok). Ne használjuk hidrogén-peroxid vagy klór alapú termékekkel, mert ezek csökkentik a hatékonyságot.

■ CAOS XT: Lombkezelés: 1-3 l/ha
Tápoldatozás: 3-6 l/ha

A Caos XT egy hatékony kalciumforrás. Az összetevők lehetővé teszik a kalcium teljes felvehetőségét és a növényben történő mozgását. A termés szárazanyag-tartalma magasabb lesz, nő a pulton tarthatóság kalcium szimptómák megjelenése nélkül.



BURGONYA

TÁPOLDATOZÁS
LOMBKEZELÉS


TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁSOK

■ + ■ RHYZO PLUS + DELL"AGRO PLUS:
1 kg/ha + 5 l/ha

A kezelést ültetés után azonnal kezdjük, majd ismétéljük 7-10 nap múlva, elősegítve a gyökérfejlődést. Emellett használjuk a Rhyzo stressz körülmények esetén helyreállítani a másodlagos és harmadlagos gyökereket. A jobb eredmények elérése érdekében ajánlatos bőséges vizet használni az öntözéshez, az öntözési ciklus közepére helyezve a kezelést.

■ DELL"AGRO PLUS: Lombkezelés: 2-4 l/ha
Tápoldatozás: 5-10 l/ha

Használjuk a teljes termelési cikluson keresztül, a növényt folyamatosan aktív állapotban tartva. Javasolt magasabb dózisú kezelés – 20 l/ha olyan esetekben, amikor a növény erős stresszhelyzetbe kerül. A kezelések bármelyik növényi ciklusban elvégezhetők, kivéve gombás fertőzés esetén. Nem keverhető kénnel és rézzel. Nem keverhető magas alkalikus reakciójú termékekkel (ásványi olajok). Ne használjuk hidrogén-peroxid vagy klór alapú termékekkel, mert ezek csökkentik a hatékonyságot.



	Vegetatív növekedés	Virágzás	Kötődés	Érés	Betakarítás
RHYZO PLUS	■				
DELL"AGRO PLUS	■	■	■	■	■
CAOS XT		■	■	■	■
MOLIBORO		■	■		
K-FORTE				■	■
TUNDAMIX	■	■	■	■	■
BATALLON				■	■

■ K-FORTE: Lombkezelés: 2-4 l/ha Tápoldatozás: 4-6 l/ha

Magas káliumtartalmú tápanyag, 100%-ban felvehető és gyorsan asszimilálódik.

■ MOLIBORO: 2 kg/ha


Serkenti a virágképződést, növeli a pollen mennyiségét és javítja a minőségét.

■ TUNDAMIX: Lombkezelés és tápoldatozás: 2-5 kg/ha

Mikroelemek keveréke teljesen oldható formában megelőzi és korrigálja ezek esetleges hiányát. Prevenióként kisebb dózisokban az egész cikluson keresztül javasolt alkalmazni. Növeljük a dózist és használat gyakoriságát súlyos hiánytünetek vagy a növény számára kedvezőtlen feltételek esetén.

■ BATALLON: Tápoldatozás: 10-20 l/ha

Szántóföldi és kertészeti kultúrák talajkezelésére a tenyészidőszak során 3-4 alkalommal.



	Vetés	Csírázás	Vegetatív növekedés	Terméskötődés	Termésnövekedés	Betakarítás
RHYZO PLUS	■					
DELL"AGRO PLUS	■	■	■	■	■	■
CAOS XT				■	■	■
K-FORTE				■	■	
TUNDAMIX	■	■	■	■	■	■
BATALLON				■	■	

■ CAOS XT: 3-6 l/ha

Alkalmazzuk a gumóképződéstől a betakarításig. A használat eredménye magasabb szárazanyag-tartalom, növelt pulton tarthatóság és jobb minőség. Tápoldatozással 15 naponta javasolt a kijuttatás, ha súlyos kalciumhiány lép fel, emeljük a dózist a maximumra. Lombon keresztül használjuk 2-8 alkalommal a vegetáció folyamán 1-3 hetente, függően a növény állapotától és tápanyag-ellátottságától.

■ K-FORTE: 4-6 l/ha

Magas káliumtartalmú tápanyag, 100%-ban felvehető és gyorsan asszimilálódik.

■ TUNDAMIX: Hiánytünetek esetén: 2-5 kg/ha
Hiánytünetek megelőzésére: 1-2 kg/ha

■ BATALLON: Tápoldatozás: 10-20 l/ha

Szántóföldi és kertészeti kultúrák talajkezelésére a tenyészidőszak során 3-4 alkalommal.



UBORKA

TÁPOLDATOZÁS
LOMBKEZELÉS

TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁSOK

RHYZO PLUS + DELL"AGRO PLUS:
1 kg/ha + 5 l/ha

Az első kezelést végezzük közvetlenül palántázás után és ismételjük meg 7 nappal később. Alkalmazzuk akkor is, ha a növénynek megnő a tápanyagigénye, pl.: termésterheltség esetén, illetve valamilyen kedvezőtlen okból bekövetkező gyökérvessztéskor. A Rhyzo generálja a gyökérszörök növekedését, amik a tápanyag- és vízfelvételért felelősek.

DELL"AGRO PLUS: Lombkezelés: 2-4 l/ha
Tápoldatozás: 5-10 l/ha

Tápoldatozással kijuttatva használjuk folyamatosan (10 naponta) 4-6 leveles állapottól kezdődően egészen az érés kezdetéig. Stressz körülmények között használjuk az emelt dóziszú kezelést. Több és jobb minőségű termés érhető el a növény kiegyensúlyozott tápanyag ellátásának köszönhetően.

MOLIBORO: Lombkezelés: 1-2 kg/ha
Tápoldatozás: 1,5-3 kg/ha

Végezzük a kezeléseket kéthetente folyamatosan az első virágok megjelenésétől kezdve. A Moliboronak köszönhetően erőteljesebb virág- és pollenképződés érhető el.

CAOS XT: Lombkezelés: 1-3 l/ha
Tápoldatozás: 3-6 l/ha

A Caos XT egy hatékony kalciumforrás. Az összetevők lehetővé teszik a kalcium teljes felvehetőségét és a növényben történő mozgását. A termés szárazanyag-tartalma magasabb lesz, nő a pulton tarthatóság a kalcium szimptómák megjelenése nélkül.



HAGYMA

TÁPOLDATOZÁS
LOMBKEZELÉS

TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁSOK

DELL"AGRO PLUS:

Öntözőrendszeren keresztül: 5-10 l/ha
Lombkezeléssel: 2-4 l/ha
3 kezelés javasolt: a hajtásnövekedés időszakában, terméskötődéskor és termésnövekedéskor.

CUPRA GL:

Öntözőrendszeren keresztül: 2-3 l/ha
Lombkezeléssel: 2-3 l/ha
Javasolt kezelés: 15 naponta

K-FORTE:



Öntözőrendszeren keresztül: 4-6 l/ha
Lombkezeléssel: 2-4 l/ha

CAOS XT:

Öntözéssel: 3-6 l/ha/hét
Lombkezeléssel: 1-3 l/ha

TUNDAMIX:

Hiánytünetek esetén: 2-5 kg/ha
Hiánytünetek megelőzésére: 1-2 kg/ha




K-FORTE: Lombkezelés: 2-4 l/ha
Tápoldatozás: 4-6 l/ha

Kígyóuborka-fajták esetén kezdjük a kezelést 5 cm terméshosszúságnál, mini kígyó, illetve salátauborka-fajták esetén 3 cm hosszúságnál, és végezzük 15-20 naponta folyamatosan.

A K-FORTE segíti a színeződést, növeli a termés méretét és cukorképződést.

TUNDAMIX: Lombkezelés és tápoldatozás: 2-5 kg/ha


Mikroelemek keveréke teljesen oldható formában megelőzi és korrigálja ezek esetleges hiányát. Prevencióként kisebb dózisokban az egész cikluson keresztül javasolt alkalmazni. Növeljük a dózist és a használat gyakoriságát súlyos hiánytünetek vagy a növény számára kedvezőtlen feltételek esetén.





BROKKOLI

- + RHYZO PLUS + DELL"AGRO PLUS:**
1 kg/ha + 5 l/ha
- DELL"AGRO PLUS:**
2 kezelés, 20 és 40 nappal a palántázás után.
5-10 l/ha/kezelés
- CAOS XT:**
4 kezelés: 20, 30, 40 és 50 nappal palántázás után.
1-2 l/ha lombon keresztül, 5 l/ha csepegtető öntözéssel.
- TUNDAMIX:**
Hiánytünetek esetén: 2-5 kg/ha
Hiánytünetek megelőzésére: 1-2 kg/ha



	Növekedés	Palánta	Vegetatív növekedés	Virágzás kezdete	1/3 fejméret	Betakarítás
RHYZO PLUS						
DELL"AGRO PLUS						
CAOS XT						
TUNDAMIX						



PAPRIKA

TÁPOLDATOZÁS
LOMBKEZELÉS

TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁSOK

- + RHYZO PLUS + DELL"AGRO PLUS:**
1 kg/ha + 5 l/ha

Javasolt kezelések: először palántázás után azonnal, majd 7-10 nappal később megismételni. A legjobb eredmény eléréséhez nagy vízzal dolgozzunk és lehetőség szerint emeljük meg a tápoldat pH-ját a jobb oldhatóság eléréséhez. Szintén javasolt az alkalmazás minden olyan esetben a fenológiai ciklusok folyamán, amikor a gyökér sérül, pl.: gyökérfulladás vagy agresszív, vegyszer okozta probléma esetén.

- DELL"AGRO PLUS:**
Lombkezelés: 2-4 l/ha
Tápoldatozás: 5-10 l/ha


Használjuk a teljes termelési cikluson keresztül, a növényt folyamatosan aktív állapotban tartva. Javasolt magasabb dózisú kezelés – 20 l/ha olyan esetekben, amikor a növény erős stresszhelyzetbe kerül. A kezelések bármelyik fenológiai fázisban végezhetők, kivéve gombás fertőzés esetén. Nem keverhető kénnel és rézzel. Nem keverhető magas alkalikus reakciójú termékekkel (ásványi olajok). Ne használjuk hidrogén-peroxid vagy klór alapú termékekkel, mert ezek csökkentik a hatékonyságot.

- CAOS XT:**
Lombkezelés: 1-3 l/ha
Tápoldatozás: 3-6 l/ha

A Caos XT egy hatékony kalciumforrás. Az összetevők lehetővé teszik a kalcium teljes felvehetőségét és a növényben történő mozgását. A termés szárazanyag-tartalom magasabb lesz, nő a pulpon tarthatóság kalcium szimptomák megjelenése nélkül.

- K-FORTE:**
Lombkezelés: 2-4 l/ha
Tápoldatozás: 4-6 l/ha

Magas káliumtartalmú tápanyag, 100%-ban felvehető és gyorsan asszimilálódik.



	Ültetés	Vegetatív növekedés	Virágzás	Kötődés	Termésnövekedés	Érés
RHYZO PLUS						
DELL"AGRO PLUS						
CAOS XT						
MOLIBORO						
K-FORTE						
TUNDAMIX						
FRUCTON FL						
BATALLON						

- FRUCTON FL: 5-8 l/ha**

A kezelést a termésnövekedés elejétől javasolt kezdeni és folytatni a betakarítás előtti 20. napig. 3-4 kezelést javasolunk beiktatni ezen időszak alatt.

- MOLIBORO: 2 kg/ha**

Serkenti a virágképződést, növeli a pollen mennyiségét és javítja minőségét.

- TUNDAMIX: Lombkezelés és tápoldatozás: 2-5 kg/ha**

Mikroelemek keveréke teljesen oldható formában, megelőzi és korrigálja ezek esetleges hiányát. Prevencióként kisebb dózisokban az egész cikluson keresztül javasolt alkalmazni. Növeljük a dózist és a használat gyakoriságát súlyos hiánytünetek vagy a növény számára kedvezőtlen körülmények esetén.

- BATALLON: Tápoldatozás: 10-20 l/ha**

Szántóföldi és kertészeti kultúrák talajkezelésére a tenyészidőszak során 3-4 alkalommal.



SALÁTA

TÁPOLDATOZÁS
LOMBKEZELÉS

TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁSOK

RHYZO PLUS + DELL"AGRO PLUS:
1 kg/ha + 5 l/ha

Javasolt kezelések: először palántázás után azonnal, majd 7-10 nappal később megismételni. A legjobb eredmény eléréséhez nagy vízádaggal dolgozzunk és lehetőleg emeljük meg a tápoldat pH-ját a jobb oldhatóság eléréséhez. Szintén javasolt az alkalmazás minden olyan esetben a fenológiai ciklusok folyamán, amikor a gyökér sérül, pl.: gyökérfulladás vagy agresszív, vegyszer okozta probléma esetén.

DELL"AGRO PLUS: Lombkezelés: 2-4 l/ha
Tápoldatozás: 5-10 l/ha

Használjuk a teljes termelési cikluson keresztül, a növényt folyamatosan aktív állapotban tartva. Javasolt magasabb dózisú kezelés – 20 l/ha – olyan esetekben, amikor a növény erős stresszhelyzetbe kerül. A kezelések bármelyik növényi ciklusban elvégezhetők, kivéve gombás fertőzés esetén. Nem keverhető kénnel és rézzel. Nem keverhető magas alkalikus reakciójú termékekkel (ásványi olajok). Ne használjuk hidrogén-peroxid vagy klór alapú termékekkel, mert ezek csökkentik a hatékonyságot.

TUNDAMIX

Hiánytünetek esetén: 2-5 kg/ha
Hiánytünetek megelőzésére: 1-2 kg/ha



SZŐLŐ

TÁPOLDATOZÁS
LOMBKEZELÉS

TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁSOK

DELL"AGRO PLUS
Lombkezelés: 3-6 l/ha.
Tápoldatozás: 5-10 l/ha. Erős stressz esetén: 20 l/ha.
A teljes vegetáció alatt végezhető kezelés a stresszhelyzetek megelőzésére.

RHYZO PLUS
Tápoldatozás: 1-3 kg/ha.
Új telepítés esetén: beöntözéssel az ültetéskor, illetve egy hét múlva ismételt kezelés. Beáztatással: 24-48 órával a telepítés előtt 0,1%-os oldatban (1 kg/1000 l víz). Termő állományban: első kezelés, rügypattanáskor majd két hét múlva ismételt kezelés.


K-FORTE
Lombkezelés: 3-5 ml/l (2-4 l/ha).
Tápoldatozás: 5-10 l/ha.
Végezzünk 3-5 kezelést bogyónövekedéstől érésig.

CUPRA GL
Tápoldatozás: 2-4 l/ha.
Lombkezelés: 2-3 l/ha.
Végezzünk kezelést a zsendülésig igény szerint.

CAOS XT
Lombkezelés: 1-3 ml/l (1-2 l/ha).
Tápoldatozás: 3-6 l/ha.
Végezzünk négy kezelést virágzástól fűtzáródásig.

TUNDAMIX
Hiánytünetek esetén: 2-5 kg/ha.
Hiánytünetek megelőzésére: 1-2 kg/ha.


MOLIBORO
Lombkezelés: 1-2 kg/ha.



	Ültetés	Vegetatív növekedés	Fejesedés	Betakarítás
RHYZO PLUS	■			
DELL"AGRO PLUS	■	■	■	■
CAOS XT		■	■	■
TUNDAMIX	■	■	■	

CAOS XT: 3-5 l/ha
3-4 cm³/l

A kezeléseket végezzük 10-12 naponta az ültetéstől kezdve a fejesedés kezdetéig. A Caos XT-vel felszámoljuk a Ca-hiány okozta tüneteket és jobb minőséget érünk el (levél szárazanyag-tartalom).



	Öltvány beáztatás telepítés előtt	20-25 cm hajtáshossz	Fűrtmegnyúlás	Virágzás	Bogyónövekedés	Zsendülés
DELL"AGRO PLUS		■			■	
RHYZO PLUS	■					
K-FORTE					■	
CUPRA GL		■			■	
CAOS XT			■		■	
TUNDAMIX		■			■	
MOLIBORO				■		



CSERESZNYE/MEGGY

TÁPOLDATOZÁS
LOMBKEZELÉS

TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁSOK

DELL"AGRO PLUS:
Lombkezelés: 2-6 l/ha. Tápoldatozás: 5-10 l/ha.
Végezzünk kezelést a rügypattanáskor, virágzás kezdetén és terméskötődés után.

RHYZO PLUS:
Tápoldatozás: 1 kg/ha. Új telepítés esetén ismételjük meg a kezelést 7 nap múlva.
Termőültetvényben: végezzük az első kezelést rügypattanáskor, majd ismételjük 15 nap múlva. Javasolt egy kezelés végzése betakarítás után.

CAOS XT:
Lombkezelés: 1-3 l/ha. Tápoldatozás: 5-10 l/ha
Almatermésűek: kezeljük a virágzás kezdetén, fővirágzáskor, szíromhulláskor és a kötődés végén.

MOLIBORO:
Lombkezelés: 1-2 kg/ha.
Tápoldatozás: 1,5-3 kg/ha.
Almatermésűek: minimum két kezelést végezzünk, virágzás előtt és teljes virágzásban.

K-FORTE:
Lombkezelés: 2-4 l/ha. Tápoldatozás: 5-10 l/ha.
Almatermésűek: 4-6 kezelés javasolt a tenyészidőszak alatt.

FRUCTON FL:
Lombkezelés: 3-4 ml/l. Tápoldatozás: 5-8 l/ha.
Végezzünk többször kezelést gyümölcs-növekedéstől a betakarítás előtti 20. napig.
ZINCO:
Lombkezelés: 1-1,5 l/ha
Tápoldatozás: 3-4 l/ha



ALMA ÉS KÖRTE

TÁPOLDATOZÁS
LOMBKEZELÉS

TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁSOK

DELL"AGRO PLUS:
Lombkezelés: 2-6 l/ha. Tápoldatozás: 5-10 l/ha.
Végezzünk kezelést a rügypattanáskor, virágzás kezdetén és terméskötődés után.

RHYZO PLUS:
Tápoldatozás: 1 kg/ha. Új telepítés esetén ismételjük meg a kezelést 7 nap múlva.
Termőültetvényben: végezzük az első kezelést rügypattanáskor, majd ismételjük 15 nap múlva. Javasolt egy kezelés végzése betakarítás után.

CAOS XT:
Lombkezelés: 1-3 l/ha. Tápoldatozás: 5-10 l/ha
Almatermésűek: kezeljük a virágzás kezdetén, fővirágzáskor, szíromhulláskor és a kötődés végén.

MOLIBORO:
Lombkezelés: 1-2 kg/ha. Tápoldatozás: 1,5-3 kg/ha
Almatermésűek: minimum két kezelést végezzünk, virágzás előtt és teljes virágzásban.

K-FORTE:
Lombkezelés: 2-4 l/ha. Tápoldatozás: 5-10 l/ha
Almatermésűek: 4-6 kezelés javasolt a tenyészidőszak alatt.

FRUCTON FL:
Lombkezelés: 3-4 ml/l. Tápoldatozás: 5-8 l/ha.
Végezzünk többször kezelést gyümölcs-növekedéstől a betakarítás előtti 20. napig.
ZINCO:
Lombkezelés: 1-1,5 l/ha
Tápoldatozás: 3-4 l/ha




	Rügyezés	Első virágok megjelenése	Virágzás	Szíromhullás/ Kötődés	Termésnövekedés/ Érés
DELL"AGRO PLUS					
RHYZO PLUS					
CAOS XT					
MOLIBORO					
K-FORTE					
FRUCTON FL					
TUNDAMIX					
BATALLON					

TUNDAMIX
Hiánytünetek esetén: 2-5 kg/ha.
Hiánytünetek megelőzésére: 1-2 kg/ha.

BATALLON: Tápoldatozás: 10-20 l/ha.

Szántóföldi és kertészeti kultúrák talajkezelésére a tenyészidőszak során 3-4 alkalommal.



	Rügyezés	Első virágok megjelenése	Virágzás	Szíromhullás/ Kötődés	Termésnövekedés/ Érés
DELL"AGRO PLUS					
RHYZO PLUS					
CAOS XT					
MOLIBORO					
K-FORTE					
FRUCTON FL					
TUNDAMIX					
BATALLON					

TUNDAMIX
Hiánytünetek esetén: 2-5 kg/ha.
Hiánytünetek megelőzésére: 1-2 kg/ha.

BATALLON: Tápoldatozás: 10-20 l/ha.

Szántóföldi és kertészeti kultúrák talajkezelésére a tenyészidőszak során 3-4 alkalommal.



ŐSZIBARACK, KAJSZI és SZILVA

TÁPOLDATOZÁS
LOMBKEZELÉS

TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁSOK

DELL"AGRO PLUS: Lombkezelés: 2-6 l/ha. Tápoldatozás: 5-10 l/ha. Végezzünk kezelést a rügypattanás-kor, virágzás kezdetén és terméskötődés után.

RHYZO PLUS: Tápoldatozás: 1 kg/ha. Új telepítés esetén ismételjük meg a kezelést 7 nap múlva. Termőültetvényben: végezzük az első kezelést rügyfakadáskor, majd ismételjük 15 nap múlva. Javasolt egy kezelés végzése betakarítás után.


CAOS XT: Lombkezelés: 1-2 l/ha. Tápoldatozás: 5-10 l/ha. Csonthéjasok: kezeljünk teljes virágzáskor.

MOLIBORO: Lombkezelés: 1-2 kg/ha. Tápoldatozás: 1,5-3 kg/ha. Csonthéjasok: tápoldatozással végezzünk kezelést teljes virágzásban.

K-FORTE: Lombkezelés: 2-4 l/ha. Tápoldatozás: 5-10 l/ha héj-keményedésig.

FRUCTON FL: Lombkezelés: 2-4 l/ha. Tápoldatozás: 5-8 l/ha. Végezzünk többször kezelést gyümölcsnövekedéstől a betakarítás előtti 20. napig.

TUNDAMIX Hiánytűnetek esetén: 2-5 kg/ha. Hiánytűnetek megelőzésére: 1-2 kg/ha.



BATALLO: Tápoldatozás: 10-20 l/ha.

Szántóföldi és kertészeti kultúrák talajkezelésére a tenyészidőszak során 3-4 alkalommal.






SZAMÓCA

TÁPOLDATOZÁS
LOMBKEZELÉS


TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁSOK


- **DELL"AGRO PLUS:**
Lombkezelés: 2-6 l/ha.
Tápoldatozás:
Szamóca: 6-8 l/ha, hetente.
- **RHYZO PLUS:**
Tápoldatozás: 2 kg/ha.
Szamóca: kezeljük ültetés után 15-20 nappal.
Ismételt kijuttatás 7 nap múlva.
- **CAOS XT:**
Lombon keresztül: 1-2 l/ha.
Tápoldatozás: 3-6 l/ha, hetente.
Szamóca:
Virágzás kezdetétől a szedés végéig használjuk.
- **K-FORTE:**
Tápoldatozás: 4-6 l/ha.
Minden növénynél: terméskötődéstől érésig.
Hetente javasolt kijuttatni, kálium-szulfáttal keverhető.
- **CUPRA GL:**
Lombon keresztül: 2-4 l/ha.
Tápoldatozás: 2-4 l/ha.
Minden növénynél: két hetente folyamatosan javasolt a kezelés. A magasabb dózist használjuk erős nyomás esetén. Bármelyik vegetációs fázisban használható.
- **TUNDAMIX:**
Kezelési javaslat:
Tápoldatozás: 2,5 kg/ha.
Minden növénynél: hiánytünetek megelőzésére a teljes vegetáció alatt használható.



■ **BATALLON:** Tápoldatozás: 10-20 l/ha.

Szántóföldi és kertészeti kultúrák talajkezelésére a tenyészidőszak során 3-4 alkalommal.





Kérjük, keresse országszerte elérhető kertészeti üzletkötőinket!

1. Pintye József

+36 30 606 9638

4. Cséfán Ákos

+36 70 931 8985

7. Bari István

+36 30 567 6973

2. Farkas Bence

+36 30 266 4872

5. Kocsis Zsombor

+36 30 855 2605

8. Varga Mihály

+36 20 346 7296

3. Tóth Bence

+36 20 339 9187

6. Kapitány Péter

+36 30 884 6518

9. Egyed László

+36 30 465 7734

Kertészeti gépértékesítési menedzser Kelet-Magyarország

Lizák Gábor +36 20 362 3372

Kertészeti gépértékesítési menedzser Nyugat-Magyarország

Pálffy Ottó +36 20 362 3413

Központi információs vonal:

+36 20 261 8937

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

2024 © KITE Zrt.